

夏





ヒルガオ 昼顔

科名:ヒルガオ科

花期:6月～8月

日あたりのよい野原や道ばたなどに生えるつる性の多年草。葉のつけ根から長い花柄を出し、日中に直径5cm程度の淡紅色の花を1個つける。



ホタルブクロ 蛍袋

科名:キキョウ科

花期:6月～7月

山野や丘陵などに生える多年草。茎は40～80cmになり、紅紫色または白色の鐘形の花をつける。子供が花に蛍を入れて遊んだのが名前の由来。



ユウゲショウ タ化粧

科名:アカバナ科

花期:7月～9月

熱帯アメリカ原産の多年草。観賞用に栽培されたものが野生化して、空地や野原、道ばたでよく見られる。高さ30～50cmの茎の上部に直径1.5cmほどの紅紫色の花をつける。



ママコノシリヌグイ

継子の尻拭

科名:タデ科

花期:5月～10月

野原や道ばたに生えるつる性の多年草。茎には刺があり、枝分かれして長さ1～2mのつるをのぼす。枝先に金平糖のような小さな花をつける。



オカトラノオ 岡虎の尾

科名:サクラソウ科

花期:6月～7月

山野や丘陵などの日あたりのよい草地に多い多年草。高さ60～100cmの茎の上部に白い小さな花が長さ10～30cmの穂になって多数つく。その姿が虎の尾に似ているので名付けられた。

。



カラスウリ 烏瓜

科名:ウリ科

花期:8月～9月

林のふちや野原などで見られるつる性の多年草。8～9月の夕方に白い大きな花を咲かせる。花冠のふちに白い糸がレース状に広がるのが特徴。秋に赤く熟した果実も美しい。



オオバトンボウ

大葉の蜻蛉草

科名:ラン科

花期:6月～7月

山地や丘陵の林床に生える多年草。高さ 25～60cm の茎の先に、1cm ほどの淡緑色の花を 10～25 個穂状につける。花の形がトンボに似ているので名付けられた。東京都絶滅危惧種。



イヌゴマ 犬胡麻

科名:シソ科

花期:7月～8月

山野の湿地に生える多年草。細長い地下茎を伸ばして繁殖する。高さ 30～70cm の茎は四角形で直立する。先端に 1.2～1.5cm の薄紫色の唇形花を輪生状につける。



シオデ 牛尾菜

科名:サルトリイバラ科

花期:7月～8月

山野に生える多年草。雌雄異株。茎はよく枝分かれして、巻きひげで他のものに絡まってのびる。葉腋から散形花序を出し淡黄緑色の花を多数つける。若芽は山菜として食され、山のアスパラと呼ばれている。



ネジバナ 捩花

科名:ラン科

花期:7月～8月

日あたりの良い野原の芝地や田の畔、土手などに生える多年草。葉の間から高さ 10～30cm の花茎をだし、5 mmほどの桃紅色の鐘形の花を多数つける。花穂が捩じれるのが名前の由来。



ヒヨドリバナ 鶉花

科名:キク科

花期:7月～8月

山地のやや乾いたところに生える多年草。高さ 1～2mの茎の上部で枝分かれして、枝先に多数の白い頭花をつける。ヒヨドリの鳴くころ、花が咲くので名付けられた。



オオバギボウシ

大葉擬宝珠

科名:キジカクシ科

花期:7月～8月

山地の草原や丘陵地などに生える多年草。長さ 30～40cm の葉は根生する。葉の間から高さ 50～100cmの花茎の先に白色または淡紫色の花を多数つける。若葉は山菜として食される。



ヤブカンゾウ 藪萱草

科名: ススキノキ科

花期: 7月～8月

道ばたや土手、林の縁などに咲く多年草。ノカンゾウより全体に大きい。高さ 80～100 cmになる茎の先端に、直径 8cmほどの橙赤色の花を咲かせる。雄しべと雌しべが花弁のようになり八重咲きとなる。



ノカンゾウ 野萱草

科名: ススキノキ科

花期: 7月～8月

野原や小川のほとりなどに生える多年草。高さ 70～80 cmの太い花茎を出す。先端は二つに枝分かれして、各々10個ほどの橙赤色の花を次々に咲かせる。若葉は甘味があり食べられる。



アキノタムラソウ

秋の田村草

科名: シソ科

花期: 7月～9月

山野の道ばたや林の縁などに生える多年草。高さ 20～80cmの茎の上部で枝分かれして 10～25cmの花穂を出し、先端に長さ 1～1.3cmの青紫色の唇形花を輪生状につける。



ヒメヤブラン 姫薺蘭

科名:キジカクシ科

花期:7月～8月

日あたりの良い草地などに生える常緑の多年草。葉より短い高さ10～15cmの花茎はやや扁平で翼がある。その上部に直径1cmほどの淡紫色の花を上向きにまばらにつける。



ジャノヒゲ 蛇の髭

科名:キジカクシ科

花期:7月～8月

山野の林床に生える常緑の多年草。葉より短い高さ10cmほどの花茎を出し、5～10個ほどの淡紫色の花を下向きにつける。緑の葉と瑠璃色の果実は美しい。別名のリュウノヒゲは細い葉を竜の髭に例えたもの。




ダイコンソウ 大根草

科名:バラ科

花期:6月～8月

山野や谷川のへりなどに生える多年草。茎は20～60cmになり、上部はまばらに枝分かれし、先端に径1.5～2cmの黄色い5弁花を数個つける。果実は直径1.5cmの集合果。



コバノカモメヅル

小葉の鷗蔓

科名:キョウチクトウ科

花期:7月～9月

山野の林縁や土手などに生えるつる性の多年草。花序は葉腋ごとに多くつけ、花柄の先は数個に分岐して、径 1cm ほどの小さな暗紫色の細い星形の花をまばらにつけ、種には綿毛がある。



ヤブミョウガ 菰茗荷

科名:ツユクサ科

花期:7月～9月

山野の林の中に生える多年草。5月頃芽を出し、7月下旬には高さ 50～100cm になり、茎の上部に径 1cm ほどの白い花を多数つける。葉がミョウガに似ているのが名前の由来。



ヤブラン 菰蘭

科名:キジカクシ科

花期:8月～9月

山地の木陰に生える常緑の多年草。葉は根生して、葉の間から高さ 30～50cm の花茎がのび、上半分に 8～12cm の花序を出して薄紫色の小さな花を多数つける。果実は黒色。



ヒヨドリジョウゴ 鴨上戸

科名:ナス科

花期:8月～9月

山野に生えるつる生の多年草。花のつく枝は葉と対生の位置に出て、ふたまた状に分かれ先端に1cmほどの白い花をつける。秋には果実は真っ赤に熟し、ヒヨドリが好んで食べることから名付けられた。



ヘクソカズラ 屁糞葛

科名:アカネ科

花期:8月～9月

日あたりのよい草薮や林のふちに多いつる性の多年草。葉のわきから短い集散花序を出し、中央が赤い長さ1cmほどの白い花をつける。花や葉をもむと悪臭がすることから名付けられた。別名ヤイトバナ。



ツリガネニンジン

釣鐘人参

科名:キキョウ科

花期:8月～9月

山野や高原などに生える多年草。茎の上部に数段に分かれて2cmほどの釣鐘形の淡紫色の花を下向きにつける。花の形と、白い太い根が朝鮮人参に似ていることから名付けられた。



ミズタマソウ 水玉草

科名:アカバナ科

花期:8月～9月

山野の木陰に生える多年草。高さ 20～60cm になる茎の先や上部の葉腋から 15cm ほどの花序を出し、白または淡紅色の小さな花をつける。球形の果実が濡れると水玉に見えることから名付けられた。



メヤブマオ 雌薺苧麻

科名:イラクサ科

花期:8月～9月

山野の道ばたや林床などの半日陰を好む多年草。高さ 1～1.2m になる。ヤブマオと比べて葉は薄く、花穂はほっそりしている。雌花の間に間隔がある。



センニンソウ 仙人草

科名:キンポウゲ科

花期:8月～9月

日あたりの良い林や道ばたに生えるつる性の多年草。茎はよく枝分かれして広がる。葉腋に 2～3cm の白い花を多数つける。羽毛状の果実の花柱を仙人の髭に見たて名付けられた。